

مراقبت از آتل :

در صورتی که با آتل از بیمارستان مرخص می شوید، رعایت این نکات برای شما ضروری است:

- حتی زمانی که نشسته اید یا دراز کشیده اید، ناحیه آسیب دیده را بالاتر از سطح قلب قرار دهید. این مهمترین اقدام در

۲۴ ساعت اول است. اما

ممکن است بسته به نوع

آسیبی که شما دیده

اید، زمان طولانی تری مورد نیاز باشد که پرستار به شما توصیه می کند. توجه داشته باشید که تورم مختصر در انگشتان اندام آسیب دیده طبیعی است.

- در طول ۲۴ ساعت اول می توانید کیسه یخی را که داخل پارچه پیچیده شده است، کنار آتل در ناحیه آسیب دیده قرار دهید. هر ۲ ساعت ۲۰ دقیقه کیسه یخ را برداشته و این کار را تکرار کنید.



کاربرد آرتوز یا بریس در شکستگی ها:

در صورتی که حمایت، کنترل حرکت و پیشگیری از آسیب های دیگر برای مدت طولانی مورد نیاز باشد، از بریس یا (آرتوز)

استفاده می کنند. انواع بریس برای

قسمتهای مختلف بدن ساخته شده اند که

ممکن است از جنس مواد پلاستیک، چرم،

کرباس و یا فلزی باشد. متخصص ارتوز، انواع

بریسها را برای قالب شدن با عضو و قرار

دادن در وضعیتهای

خاص و حرکت دادن

عضو طراحی می کند.



کاربرد آتل در شکستگی ها :

در مواردی که لازم نیست عضو به طور کامل بی حرکت شود، ولی خطر تورم شدید آن وجود دارد و یا مراقبت های پوستی مخصوص مورد نیاز است، می توان از آتل های طراحی شده گچی یا مواد قابل انعطاف ترموپلاستیک استفاده کرد.

آتل، اندام را در وضعیت کاربردی آن بی حرکت کرده و از آن حمایت می کند. برای جلوگیری از وارد شدن فشار بر روی پوست و خراشیدگی و گسیختگی آن، باید آتل به طور کامل با نوارهای نرم پوشانده شود. نوارکشی را بر روی آتل به شکل مارپیچ و با فشار یکنواخت می پیچند تا جریان خون اندام دچار مشکل نشود.

توصیه ی مهم در بیماری که آتل دارد:

باید انگشت های اندام را از نظر دما و رنگ پوست بررسی کرد و هرگونه سردی، رنگ پریدگی، کبودی، بی حسی و اشکالات حرکتی را فوراً به پزشک اطلاع دهید.

هنگام استفاده از آتل به دلیل اینکه عضو کاملاً بی حرکت نمی شود، مراقبت از پوست و درمان تورم راحت تر انجام می گیرد.

مراقبت از آتل در شکستگی ها



در صورت مشاهده هریک از موارد زیر فوراً به پزشک مراجعه کنید:

- * اگر اندام زیر آتل تورم شدید دارد.
- * اگر قادر به حرکت دادن مفاصل مجاور نیستید.
- * اگر دچار گزگز و مورمور زیر آتل شدید.
- * اگر انگشتان دست یا پا بی حس شده اند.
- * اگر زیر آتل زخم یا جراحت ایجاد شده و یا بوی نامطبوع از آن حس می کنید.
- * اگر در ناحیه انگشتان احساس کبودی یا سردی می کنید.
- * در صورتی که آتل ترک یا شکستگی دارد.
- * اگر درد شدیدی دارید که با مسکن برطرف نمی شود.
- * اگر دچار درد شدید در زیر پاشنه ی پا، شدید، ممکن است ناشی از فشار آتل به پوست خلف پاشنه باشد، کمی پنبه در زیر آتل قرار دهید اگر مشکل برطرف نشد در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنید. مراجعه ی دیر هنگام ممکن است باعث زخم شدن پوست شود.

در این صورت مراجعه سریع و به موقع شما به مرکز درمانی از بروز مشکلات بعدی جلوگیری می کند.

- در مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول که هنوز آتل خوب شکل نگرفته و خشک نشده است، روی آن را با هیچ چیز نپوشانید. روی آتل پا حداقل تا ۴۸ ساعت نیروی وزن اضافی و فشار وارد نکنید.
- سطح آتل را تمیز نگه دارید. با استفاده از یک پارچه تمیز مرطوب می توانید سطح آتل را تمیز کنید. داخل آتل را با کمی پنبه الکلی پاک کنید، سپس در معرض هوا قرار دهید تا خشک شود.



- آتل هرگز نباید خیس شود، چون پوست مرطوب مستعد آلودگی است. هنگام استحمام یا زیر باران آتل را با یک کیسه پلاستیکی بپوشانید.
- هیچ گاه جسم خارجی زیر گچ یا آتل قرار ندهید. خراش و آسیب دیدگی پوستتان ممکن است باعث ایجاد زخم و عفونت پوستی شود.
- مفاصل سالم مجاور را که با آتل بی حرکت شده اند، حرکت دهید. مثلاً اگر آتل بلند پا دارید، مفاصل انگشتان پا و مفصل لگن را نرمش دهید. اگر آتل بازو دارید، مفاصل شانه، آرنج، شست و انگشتان دست را ورزش دهید.