

نمونه برداری چگونه انجام می شود؟

- ♦ ابتدا یک رگ وریدی از شما گرفته می شود.
- ♦ قبل از انجام بیوپسی داروی آرامبخش داده می شود
- ♦ همچنین ضمن انجام بیوپسی در محل ورود سوزن بیوپسی بی حسی موضعی داده می شود.
- ♦ روی برانکار بر روی شکم دراز می کشید و بالشی در فاصله بین شکم و سطح سفت گذاشته می شود تا کلیه به سمت پشت فشرده شود.
- ♦ در صورت نمونه برداری از کلیه پیوندی بیمار به پشت دراز می کشد.

مراقبتهای پس از جراحی

- ◇ استراحت: به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از بیوپسی، استراحت کامل داشته باشید.
- ◇ تا ۶ ساعت پس از بیوپسی شما باید ناشتا باشید.
- ◇ شما طی ۲۴ ساعت سرم دریافت می نمایید.
- ◇ تا ۲۴ ساعت فشارخون ضربان قلب و تنفس و سطح اکسیژن خون به دقت کنترل می گردد.
- ◇ مایعات: مایعات کافی بنوشید تا از کم آبی بدن جلوگیری کنید.
- ◇ داروها: داروهای تجویز شده توسط پزشک را به طور مرتب مصرف کنید.

* مشکلات پزشکی (سابقه سنگهای ادراری)

* در صورت بارداری

آمادگی های قبل از انجام بیوپسی کلیه

- معمولاً قبل از انجام بیوپسی، تستهای تشخیصی جهت بررسی عملکرد کلیه، آزمایش ادرار، انعقادی و سونوگرافی کلیه ها انجام می گردد.
- پزشک معالج دلایل انجام بیوپسی، راههای تشخیصی جایگزین و عواقب عدم انجام بیوپسی را به طور کامل برای بیمار شرح می دهد.
- بیمار برای انجام نمونه برداری در بخش بستری می شود.
- از ۸ ساعت قبل از انجام کار ناشتا باشید.
- برخی از داروها نیاز است یک هفته قبل از انجام بیوپسی با نظر پزشک قطع گردند مثل داروهای رقیق کننده خون از جمله آسپرین و یا بروفن، وارفارین، پلاویکس و ...
- در مورد مصرف یا قطع داروهای دیابت قبل از انجام بیوپسی با پزشک مشورت نمایید.

نمونه برداری از کلیه روش تشخیصی مهمی برای شناسایی علت بیماری کلیه است که با برداشتن نمونه ی کوچکی از کلیه، از راه پوست، توسط سوزن با کمک سونوگرافی انجام می شود.

بررسی نمونه زیر میکروسکوپ تا حد زیادی به تشخیص علت بیماری کلیه کمک می کند و بدون تشخیص علت درگیری، درمان قطعی بیماری امکان پذیر نمی باشد.

مراقبتهای قبل از بیوپسی

قبل از انجام بیوپسی موارد زیر را به پزشک اطلاع دهید:

- * سابقه هر گونه حساسیت و آلرژی
- * مصرف هرگونه دارو با یا بدون نسخه پزشک
- * سابقه هرگونه حساسیت و واکنش در خود و سایر اعضای خانواده
- نسبت به داروهای بیهوشی
- * سابقه هر گونه مشکلات خونی
- * در صورت تک کلیه بودن
- * سابقه هر گونه جراحی قبلی
- * وجود علائم عفونت ادراری

بیوپسی کلیه



باید از انجام فعالیت‌های سنگین و برداشتن بار سنگین تر از ۴/۵ کیلوگرم خودداری نمایید.

- داروهای تجویز شده پس از بیوپسی را به دقت مصرف نمایید.
- در صورت مشاهده علائم زیر به پزشک مراجعه

نمایید:

- ⇒ علائم عفونت محل بیوپسی
- ⇒ ادرار قرمز تیره یا قهوه ای
- ⇒ تب و لرز
- ⇒ عدم توانایی در ادرار کردن
- ⇒ سوزش ادرار
- ⇒ درد شدید در شکم و یا طرفین شکم
- ⇒ احساس ضعف و بیحالی و از دست رفتن هوشیاری
- ⇒ افت فشارخون

◇ مسکن‌ها را طبق دستور پزشک برای کاهش درد مصرف کنید.

◇ محل نمونه‌گیری را تمیز و خشک نگه دارید.

◇ از دست زدن به محل نمونه‌گیری خودداری کنید.

مراقبت در منزل

- روزانه محل بیوپسی را از نظر علائم عفونت از قبیل قرمزی، تورم و درد و ترشحات چرکی و یا خونریزی، گرمی و بوی بد چک کنید. و در صورت داشتن علائم به پزشک خود اطلاع دهید.
- از رژیم غذایی سالم و متعادل پیروی کنید.
- در زمان تعیین شده برای بررسی نتایج بیوپسی به پزشک خود مراجعه کنید.
- از استعمال دخانیات و مصرف الکل خودداری کنید.
- وجود ادرار کدر و صورتی رنگ که حاوی مختصری خون باشد، نرمال است و جای نگرانی ندارد، ولی در صورت ادرار خونی، سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید.
- تا ۲۴ ساعت پس از انجام بیوپسی، رانندگی توصیه نمی‌شود.
- تا زمان اجازه پزشک (معمولاً تا دو هفته) پس از انجام نمونه برداری