

آمادگی‌های قبل از انجام بیوپسی کبد

۳- سپس با ماده ضدعفونی کننده محل نمونه برداری ضدعفونی شده

و با سوزن نازک ماده بی‌حس کننده در محل تزریق می‌گردد.

۴- محل ورود سوزن بیوپسی با یک تیغ خیلی ظریف باز می‌شود و سپس سوزن نمونه برداری از پوست و فاصله بین دنده‌ای به کبد عبور داده می‌شود. از بیمار خواسته می‌شود تا با تنفس آهسته پزشک را به رسیدن سوزن به سطح کبد کمک کند، سپس بیمار برای چند لحظه کوتاه نفس خود را نگه می‌دارد و در این زمان پزشک ظرف چند ثانیه تکه کوچکی از کبد را نمونه برداری می‌کند.

۵- ممکن است عبور دادن سوزن و نمونه برداری برای چند بار تکرار شود تا نمونه کافی به دست آید سپس محل نمونه برداری به دقت پانسمان می‌شود و بیمار به پهلوی راست خوابیده تا محل نمونه برداری محافظت شود.



- ۱ از ۶ ساعت قبل از انجام کار ناشتا باشید.

- **برخی از داروها نیاز است تا قبل از انجام بیوپسی با نظر پزشک قطع گردند مثل داروهای رقیق کننده خون از جمله آسپرین وارفارین و پلاویکس**

- در مورد مصرف یا قطع یا تغییر دوز داروهای دیابت قبل از انجام بیوپسی با پزشک مشورت نمایید.

- قبل از شروع بیوپسی بهتر است مثانه خود را خالی کنید زیرا پس از بیوپسی باید حداقل تا ۳ ساعت به پهلوی راست روی تخت بخوابید و در این مدت از تخت با این نیایید.

نمونه برداری چگونه انجام می‌شود

۱- شما در اتاق سونوگرافی باید در حالت طاق باز به پشت، روی تخت خوابیده و دست راست خود را بالای سر قرار دهید.

۲- پزشک محل کبد را در قسمت راست شکم با کمک دستگاه اولتراسوند (سونوگرافی) و با معاینه مشخص نموده و علامت گذاری می‌کند.

کبد بزرگترین ارگان داخل شکم است که در بالا و سمت راست شکم و زیر قفسه سینه قرار گرفته است. کبد عملکردهای متعددی داشته و وجود آن برای حیات ضروری می‌باشد. بیوپسی کبد و یا همان نمونه برداری از کبد به معنی برداشتن مقدار کوچکی از بافت کبد است که معمولاً بوسیله ی یک سوزن انجام می‌شود.

هدف از انجام نمونه برداری کبد :

۱- بررسی وضعیت سلولهای کبد و تشخیص اختلالات کبدی

۲- تعیین شدت بیماری‌های کبدی

۳- اتخاذ سیاست‌های درمانی


۴- تعیین اثر بخشی های مختلف درمانی

مراقبت‌های قبل از بیوپسی کبد

قبل از انجام بیوپسی موارد زیر را به پزشک اطلاع دهید

- * سابقه هرگونه حساسیت و آلرژی
- * مصرف هرگونه دارو یا بدون نسخه پزشک به خصوص وارفارین آسپرین و پلاویکس
- * سابقه هرگونه مشکلات خونی
- * سابقه هرگونه جراحی قبلی سابقه هرگونه مشکلات پزشکی

بیوپسی کبد



علائم هشدار دهنده

در صورت بروز علائم زیر به پزشک مراجعه کنید:

- ◇ خونریزی
- ◇ قرمزی و تورم محل بیوپسی
- ◇ تب و لرز
- ◇ درد شکم
- ◇ تهوع و استفراغ

مراقبت های پس از بیوپسی

* پس از انجام بیوپسی تا حداقل ۳ ساعت به پهلوی راست می خوابید تا از خونریزی پیشگیری شود.

* تا ۴ ساعت تحت نظر قرار می گیرید.

* فشار خون و نبض شما کنترل می شود.

* در صورت درد محل بیوپسی مسکن تجویز می شود.

مراقبت در منزل

- در منزل حداقل ۱ تا ۲ روز استراحت داشته باشید
- تا ۲۴ ساعت تنها نباشید
- در ۲۴ ساعت اول از انجام رانندگی و استحمام خودداری کنید
- از محل بیوپسی طبق توصیه پزشک مراقبت و پانسمان آن را تعویض نمایید.
- تا دو هفته از انجام فعالیت های سنگین و بلند کردن اجسام بیش از ۳ کیلوگرم خودداری کنید
- داروهای تجویز شده توسط پزشک را به دقت مصرف نمایید.