


برونکوسکوپي چیست؟

- برونکوسکوپي یک روش تشخیصی در بیماری های ریه است.
- که برای پزشک امکان معاینه مجاری تنفسی حنجره، تراشه، برونش را توسط یک وسیله کوچک و باریک به نام برونکوسکوپ فراهم می سازد.
- پزشک می تواند هر گونه تنگی و یا اختلالی را در مجاری تنفسی توسط دوربینی که به انتهای برونکوسکوپ نصب شده است. مشاهده نماید.
- همچنین توسط این وسیله پزشک می تواند از بافت مجرای تنفسی نمونه برداری کند به تشخیص مشکل شما کمک خواهد کرد
- و یا اجسام خارجی و یا ترشحات موجود در مجرای تنفسی را خارج سازد.



برونکوسکوپي می تواند در یک اتاق مخصوص یا اتاق عمل بیمارستان انجام شود.

مراقبت های قبل از برونکوسکوپي

- از هشت ساعت قبل از آزمون از خوردن و آشامیدن خودداری کنید.
- از ۲۴ ساعت قبل از آزمون از خوردن نوشیدنی های حاوی الکل اجتناب کنید.
- دندانهای مصنوعی (حتی تک دندان مصنوعی)، لنزهای تماسی و هرگونه زیور آلات خود را خارج کنید.
- در زمان مراجعه کلیه مدارک پزشکی خود را همراه داشته باشید.
- حتما یک نفر همراه با خود داشته باشید.
- داروهای تجویز شده را طبق نظر پزشک خود مصرف کنید.
- چنانچه داروهای فشار خون، دیابت، تشنج و داروهای قلبی استفاده می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
- داروهای رقیق کننده ی خون مانند آسپرین، وارفارین و پلاویکس باید چند روز قبل با نظر پزشک قطع شود. چرا که این قبیل داروها احتمال خونریزی حین برونکوسکوپي را افزایش می دهد.
- در صورت داشتن هرگونه حساسیت و یا آلرژی پزشک را مطلع سازید.

- در صورت بارداری حتما با پزشک مشورت نمایید.
- در صورتی که به بیماری هپاتیت با ایدز مبتلا هستید حتما قبل از انجام برونکوسکوپي به پزشک خود اطلاع دهید تا راهکارهای مربوطه را برای عدم انتقال بیماری انجام دهد.
- ممکن است قبل از انجام برای شما، آرامبخش استفاده شود. دریافت آرامبخش به حفظ آرامش شما حین جاگذاری برونکوسکوپ کمک خواهد کرد

روند کار برونکوسکوپي

- * از شما خواسته می شود که بر روی تخت برونکوسکوپي دراز بکشید.
- * مانیتور قلبی و تنفسی و فشار خون خواهید شد.
- * بلافاصله قبل از آزمون برای بی حسی گلو از دارو استفاده می شود. این کار به حرکت آسان تر برونکوسکوپ به داخل تراشه کمک می کند.
- * این آزمون ۳۰-۶۰ دقیقه بطول می انجامد.
- * بعد از تاثیر داروهای بی حسی، برونکوسکوپ از طریق بینی و یا دهان به داخل مجرای تنفسی هدایت خواهد شد.

برونکوسکوپي



داشته باشید که طبیعی است. غرغره آب گرم می تواند به کاهش ناراحتی شما کمک کند. فقط قبل از اینکه بخواهید. غرغره کنید مطمئن شوید بی حسی کاملا از بین رفته است.

♦ با توجه به استفاده از داروهای آرامبخش تا هوشیاری کامل در ریکاوری مراقبت می شوید تقریباً یک ساعت بعد از برونکوسکوپي اثر داروها تا حدودی کاهش می یابد.

♦ ولی ممکن است اثر داروهای مسکن و آرام بخش یک روز طول بکشد تا کاملاً از بین برود. پس باید در نظر داشته باشید که به علت احتمال سرگیجه و خواب آلودگی از هرگونه رانندگی، کار با دستگاه های مکانیکی و مصرف نوشیدنی های الکلی تا ۲۴ ساعت اجتناب نمایید.

♦ یک تا سه روز بعد، نتیجه ی برونکوسکوپي به شما داده می شود.

♦ در صورت نمونه برداری، بافت برداشته شده جهت بررسی های بیشتر به پاتولوژی فرستاده می شود بنابراین باید پیگیر نتیجه نمونه برداری خود باشید.

♦ **علایم هشدار که در صورت مشاهده باید به پزشک مراجعه کنید:**

- ۱- وجود تب بیش از ۲۴ ساعت
- ۲- افزایش درد قفسه سینه
- ۳- سرفه همراه با خون بیش از چند قاشق غذا خوری
- ۴- تنفس سخت و مشکل

* همزمان با جلو راندن برونکوسکوپ، در صورت نیاز مقدار کمی داروی بی حس کننده به منظور کاهش سرفه و خس خس کردن از لوله جانبی برونکوسکوپ به داخل مجرای تنفسی اسپری و یا تزریق می شود.

* توسط برونکوسکوپ از مجاری تنفسی بزرگ (برونش ها عکس برداری خواهد شد. شما ممکن است در حین برونکوسکوپي دچار ناراحتی شوید. فراموش نکنید که باید آرامش خود را حفظ نمایید.

* توجه داشته باشید زمانی که برونکوسکوپ از طریق دهان وارد می شود شما باید دم و بازدم را از طریق بینی و با دهان باز انجام دهید.

مراقبت های بعد از برونکوسکوپي :

♦ بعد از برونکوسکوپي چندین ساعت تحت نظر خواهید بود.

♦ دهان و گلو شما احتمالاً برای چند ساعت بی حس می شود تا زمانی که بی حسی از بین نرود مجاز به خوردن و آشامیدن نیستید. این کمک می کند تا غذا و مایعات به مجاری تنفسی و ریه ها وارد نشوند.

♦ وقتی دهان و گلو دیگر بی حس نبود و توانستید دوباره بطور طبیعی آب دهان خود را قورت دهید و سرفه کنید.

♦ با دستور پزشک می توانید برای شروع، جرعه ای آب بنوشید بعد از آن غذاهای نرم مانند سوپ و سپس غذاهای دیگر را میل نمایید.

♦ ممکن است گلودرد خفیف، گرفتگی صدا، سرفه یا درد عضلانی